

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

ABONNEMENT ANNUEL

Poste 93)

12 NF

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, 2, rue de l'Hôpital Militaire  
STRASBOURG.

4 Août 1961

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

Supplément n° 3 au Bulletin de Juillet

## POMMES DE TERRE

### Avertissement

#### MILDIOU

Dans les parcelles de variétés demi-hâtives où l'on note des débuts d'attaques de Mildiou, il est conseillé de pratiquer la destruction prématurée des fanes (fauchage et enlèvement ou pulvérisation chimique).

Variétés demi-tardives ou tardives, sensibles à la maladie, un traitement fongicide est recommandé dès réception de cette note.

#### NOTE SUR LA DESTRUCTION PREMATUREE DES FANES

La méthode chimique par l'emploi du Chlorate de soude est la plus répandue. Nous précisons l'intérêt d'ajouter un mouillant du commerce à la dose indiquée par le fabricant. A raison de 20 à 25 kg/ha, le Chlorate de soude ne présente aucun risque de remanence pour les cultures suivantes. Rappelons qu'il existe aussi des défanants chimiques autres que le Chlorate de soude (Défanol, Quinofanes, Reglone, Weedkiller, T.o9). Mouiller le mieux possible à raison de 800 à 1.200 litres/ha. Une certaine mutilation des tiges opérée immédiatement avant le traitement chimique est recommandée ; l'effet du défanant est alors beaucoup plus rapide.

## ARBRES FRUITIERS

### Avertissement

#### CARPOCAPSE

Les sorties de papillons ont été assez peu nombreuses et la faiblesse des températures crépusculaires, malgré quelques journées chaudes, ont limité les accouplements et les pontes.

Toutefois dans les situations les mieux exposées, on peut craindre de nouvelles attaques au cours des prochains jours. Pour assurer une protection parfaite, il paraît nécessaire de renouveler le traitement conseillé le 15/7, dont les dépôts des produits ont été en partie délavés par les fortes précipitations des 27 et 28 Juillet.

Utiliser l'un des produits conseillés précédemment.

#### TAVELURE

Tenir compte des observations données à ce sujet. Dans les vergers où la protection a été insuffisante au printemps, il est nécessaire de poursuivre les traitements d'autant que le temps instable de la saison (pluies intermittentes) favorise les repiquages de la maladie sur fruit.

46